

Busulfan, AUC Infusion

Beställare: _____

Patientidentitet: _____

Fax: _____

Tfn: _____

Läkare: _____

Diagnos: _____ SCT-datum: _____ Preparatnamn: _____

Längd (cm)	Vikt (kg)	Kroppsyta (m ²)	Kön
			<input type="checkbox"/> Man
			<input type="checkbox"/> Kvinna

Konditionering: BuCy FluBu Annat: _____

Senaste dos (mg): _____

Tidpunkt senaste dos: Datum: _____ Kl.: _____ (Infusionsstart)

Infusion: 1 dos/dygn 2 dos/dygn Infusionstid (h): _____

Tot. antal behandlingsdagar: _____ Aktuell behandlingsdag (1, 2 el. 3): _____

Mål AUC (ng*h/mL): 60 000 90 000 Annat: _____

Förvarning om provtagning ska ske minst 1 vecka i förväg via mail, vid förändringar med kort varsel ring laboratoriet.

Kontaktuppgifter:

Klinisk Farmakologi läkemedelslaboratoriet

Email: farmakologi.karolinska@regionstockholm.se

Tfn: 072-547 29 82 (laboratoriet)

Adress: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Klinisk Farmakologi

Läkemedelslaboratoriet, C2:69

141 86 Stockholm

Kontakt har tagits med	Datum	Klockan	Signatur

Busulfan, AUC Infusion

- Prov 1 är alltid provet innan infusionsstart.
- Fyll i tid från infusionsstart i timmar (h). Tiderna anges från infusionsstart.
- Fyll i det exakta datumet och klockslaget som provet togs.

Prov nr.	Tid från infusionsstart. (h)	Datum	Provtagningsstid (klockslag)		RID (Karolinska)
			Planerad till:	Genomförd	
1.	0 Prov taget innan infusionsstart				
Infusionsstart (klockslag) och infusionsstopp (klockslag):					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Provtagning se provtagningsanvisningarna;

<https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/provtagningsanvisningar-a-o/>

- Ca 3-5 ml (vuxna) och 1-2 ml (barn) blod tas i EDTA- eller heparin-rör och centrifugeras omedelbart.
- Plasman överförs till ett nytt rör och **frysas direkt i -20 °C**.
- Provet märks med RID (internt) eller patientens namn, personnummer (reservnummer), datum och klockslag för provtagning.
- Vid ny provtagningsserie ska en ny blankett fyllas i med samtlig information.
- **Efter provtagning skall proverna skickas till Klinisk Farmakologi (se adress), enligt överenskomna rutiner.**