

## Patientanvisning för *Clostridium difficile*, *Helicobacter pylori*, virus och parasiter

### Inför provtagningen behövs

- Fecesarör med sked
- Transporthylsa
- Remiss
- Om provet ska skickas med post behövs: transportkuvert med adress och porto



Fecesarör med sked och transporthylsa

### Provtagning

*Observera, vid upprepade provtagningar bör proverna tas på olika dagar.*

1. Både fecesaröret och transporthylsan ska vara märkta med namnetikett eller nummeretikett från remissen, alternativt skriv ditt namn och personnummer.
2. Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Använd skeden och fyll fecesaröret med 2-3 skedar avföring. Sätt tillbaka skeden i fecesaröret och skruva på locket.
3. Stoppa röret i transporthylsan och skruva på locket ordentligt. Förvara provet kallt (+2 till +8 grader) i väntan på transport.
4. Fyll i datum och tid för provtagningen på remissen.
5. Lämna provet snarast, helst samma dag, på närbeläget närvårdslaboratorium.
6. Om provet ska skickas med post.  
Lägg provet och remissen i transportkuvertet och lämna i brevlåda eller på postkontor. Undvik fredagar och dag före helgdag eftersom ingen utdelning av post sker nästföljande dag.